*Fl. taur. p. 174. Seb. et Maur. Fl. rom. prodr. p. 139. Moric. Fl. venet. 1. p. 183. Pollin. Fl. veron. 3. p. 223. Nacc. Fl. venet. 5. p. 82. Ten. Fl. nap. 2. p. 371 et Syll. p. 193. Gaud. Fl. helv. 6. p. 327. Presl Fl. sic. 1. p. 193. Sang. Cent. p. 57. Spach in Ann. des sc. nat. 2me. sér. tom. 2. p. 166. Bert. Fl. ital. 4. p. 355. Puccin. Syn. fl. luc. p. 210. De Not. Rep. fl. lig. p. 82. Koch Syn. fl. germ. et helv. edit. 2. p. 149. Gren. et Godr. Fl. de Franc. 1. p. 322. Hausm. Fl. Tir. 1. p. 168. Pirona Fl. Foroj. p. 24. Saccard. Fl. trevig. p. 33. Comoll. Fl. comens. 7. p. 246. Vis. Fl. dalm. 3. p. 221. Caruel Prodr. della fl. tosc. p. 116. Ardoin. Fl. des Alp. marit. p. 86. Boiss. Fl. orient. 1. p. 948. Terracc. Fl. Vult. p. 41. Siemoni Manuale forest. edit. 2. p. 124. Vis. et Saccard. Cat. piant. venet. p. 229. Zersi Cat. piant. bresc. p. 46.*

Acer marsicum *Guss. Pl. rar. p. 375.*

Acer austriacum *Tratt. Archiv. 1. tab. 6. Ten.! Syll. p. 193 et Fl. nap. 5. p. 292.*

Acer collinum *Ten. Syll. p. 194.*

Opulus *Cæsalp. De plant. lib. 2. cap. 12. p. 42.*

Acer campestre. Opulus. Oppio *Cæsalp. Herb. fol. 5. n. 14.*

Acer campestre et minus, pericarpio externe rubente *Cup. H. Cath. suppl. alt. p. 4. Seg. Pl. veron. 2. p. 303.*

**Nome italiano.** — Oppio, Pioppo, Testucchio.

**Figure.** — *Reich. Icon. f. 4825.*

Acer campestre, minus *Cup. Panph. 1. tab. 131.*

**Stazione, Abitazione e Fioritura.** — Nei boschi e nelle siepi della regione della Querce e del Castagno, dove si spinge sino a 800 metri circa sul livello del mare e donde discende talvolta nella regione dell'Olivo. È comune nelle parti settentrionali e centrali della penisola: nelle parti meridionali e nelle isole di Sicilia e di Corsica è meno comune, e nasce nei monti. In Sicilia nasce nei monti delle Madonie dove l'ho raccolto, nei boschi della Ficuzza e di Valdemone (Guss. e Todaro!), nei boschi di Caronia, nel Monte dei Cani e a Buccheri (Guss.), a Gibilmanna e a Palazzo Adriano (Gasparr.); in Corsica a Orezza (Soleirol sec. Bert.), nei monti di Calci (Erb. Webb!). Nasce pure nell'Isola dell'Elba (Marcucci!), e secondo Bertoloni nell'Isola del Giglio. Fiorisce in Aprile e Maggio.

**Distribuzione geografica.** — Pianta estesa dalle parti meridionali della Svezia! e dell'Inghilterra! fino in Sicilia e in Macedonia. Nasce pure in Oriente, dove si spinge sino al Caucaso! e alla Persia!